

Cerisier tardif

Cerisier d'automne ; Cerisier noir

Black Cherry




Feuilles :

lancéolées, denticulées et pointues ;
5 à 12 cm de longueur

Été : vert foncé, luisantes

Automne : jaune orangé ou rouges



Écorce



Fleurs :

longues grappes pendantes ;
10 à 15 cm de longueur

Couleur : blanches

Saison : printemps

Odeur : légèrement parfumées



Fruits :

drupes ; 8 mm de diamètre ;
persistant jusqu'en octobre

Couleur : rouges, puis noirs

Saison : automne

Utilisation animale : oiseaux

Remarques :

rustique, indigène du Québec ; légèrement sensible à la pollution urbaine ; bois recherché en ébénisterie



Espacement requis :

10 m



Famille : Rosacées

Forme : grand arbre

Zone de rusticité : 2 b

Croissance : moyenne

Exposition : soleil

Hauteur : 20 m

Largeur : 10 m

Valeur ornementale : élevée

Aspect : port conique, puis ovoïde et irrégulier ; rameaux retombants ; écorce presque noire chez les vieux individus, odorante et s'exfoliant

Disponibilité : faible

Usages : isolé, massif et naturalisation ; approprié dans les grands espaces

Sol :

Humidité : moyenne

Texture : loameuse

pH : neutre

Compactage : faible tolérance

Sel de déglacage : tolérance

Sol : sols profonds, riches et humides

Enracinement : enracinement profond ; planter des sujets produits en motte ou en pot pour une meilleure reprise

Taille : taille après la floraison au besoin

Maladies : légère sensibilité : nodule noir

Insectes : peu de problèmes entomologiques